


Klagemuligheder

Hvis du efter en behandling oplever gener eller ubehag, der har en karakter, som du ønsker at klage over, eller hvis du evt. ønsker at anlægge et erstatningssøgsmål, skal du kontakte din akupunktør med det samme.

Du kan dertil kontakte Praktiserende Akupunktørers Ethiske Råd, som vil håndtere klagesager og viderebringe det til forsikringen.

Find oplysninger på Etisk Råd på www.aku-net.dk

Kontakt-info på akupunktøren:



Klientinformation om mulige bivirkninger ved akupunkturbehandlinger

Formål med akupunktur

Alle behandlinger har til formål at lindre eller afhjælpe de symptomer eller gener, som du har henvendt dig med.

Langt de fleste klienter oplever under og efter behandlingen velvære og en rar fornemmelse i kroppen, samt øget energi og bedre søvn. Risikoen for bivirk-

ninger er relativt beskedne - og langt fra hyppige.

Læs denne pjece igennem, hvor der oplyses om de potentielle risici samt de mulige gener og ubehag, der kan opstå under eller efter behandlingen.

For samtlige behandlingsformer gælder

Din krop stimuleres af behandlingerne til øget udskillelse af ophobede affaldsstoffer, som hos nogle mennesker kan give gener. Nogle oplever, at det er gavnligt at drikke lidt ekstra vand samme dag og dagen efter behandlingen.

Langt de fleste bivirkninger går i sig selv igen. Skulle du opleve u hensigtsmæssige bivirkninger under eller efter behandlingen, oplys straks din akupunktør omkring dette. Akupunktøren vil handle forsvarligt derefter og ved alvorlige tilfælde ringe efter en ambulance.

Oplever du bivirkninger, når du har forladt klinikken, skal du

enten oplyse din akupunktør herom inden næste behandling eller kontakte din egen læge. Oplever du åndenød og brystsmerte under eller efter en akupunkturbehandling, skal du straks oplyse akupunktøren, hvis du stadig er i klinikken og hvis du har forladt klinikken, skal du ringe 112.

Kropsakupunktur – risici

Almindelige bivirkninger (1-10%)
er mindre blødning og blå mærker.

Ikke almindelige bivirkninger (0,01-0,001%)

inflammation ved indstiksstedet, hævelse, smerte mens nålen er i og lokal muskelsmer-
te, nerveirritation eller skade. Dette kan give føleforstyrrelser eller midlertidig muskelsvag-
hed i den påvirket muskel. Træthed, hovedpine, kvalme og svimmelhed kan opleves. Med til de ikke almindelige bivirkninger hører også en mulig forværring af de symptomer, som er der blevet behandlet.

Sjældne bivirkninger (0,001-0,0001%)

udgør lokal irritation, rødme, kløe, øget sved, fald eller stigning af blodtryk, bevidstløshed, hurtig hjerterytme, åndedrætsbesvær, opkast, forværring af helbred, generelle muskelsmer-
ter, begrænset bevægelighed, ledproblemer, kuldefølelse, menstruationsproblemer, depres-
sivt humør, angst, søvnproblemer, rastløshed, nervøsitet, forstyrret syn og tinnitus.

Meget sjældne bivirkninger (<0,0001%) hjer-
tebanken, forstoppelse, diarré, mavekrampe, vægttab, kredsløbsforstyrrelser, læsion på blodkar, infektion i kroppen, mareridt, dårlig koncentration, taleforstyrrelse, konfus, rystelser, øjeirritation, eufori, pneumothorax, påvirkning af balancen.

(Kilde: Witt, C.M., Pach, D., Brinkhaus, B., Wruck, K., Tag, B., Mank, S. and Willich, S.N., 2009. Safety of acupuncture: results of a prospective observational study with 229,230 patients and introduction of a medical information and consent form. Forschende Komplementarmedizin (2006), 16(2), pp.91-97.)